

Мирола

1 2021

ПОИСКИ ЖИЗНИ НА МАРСЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Схожесть условий на ранних стадиях развития Земли и Марса не исключает возможности появления жизни на Красной планете. Где живые организмы могли сохраниться там до наших дней и как их обнаружить?

с. 4

Микротомография ископаемых мшанок

А.В.Коромыслова¹, З.А.Толоконникова^{2,3}, П.В.Федоров⁴, А.В.Пахневич^{1,5}

¹Палеонтологический институт имени А.А.Борисяка РАН (Москва, Россия)

²Кубанский государственный университет (Краснодар, Россия)

³Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань, Россия)

⁴Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия)

⁵Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Московская обл., Россия)

Мшанки — это колониальные животные, имеющие сложноустроенный скелет. Методы, которые обычно используют для исследования внутреннего строения ископаемых колоний мшанок, часто бывают разрушающими, трудоемкими и нередко малоинформативными. Представлены результаты исследования палеозойских и мезозойских мшанок методом рентгеновской компьютерной микротомографии. Авторы полагают, что в будущем этот метод будет приобретать все большее значение для исследования фоссилий.

Ключевые слова: палеонтология, мшанки, рентгеновская компьютерная микротомография, ордовик, карбон, пермь, поздний мел.

Мшанки (тип *Bryozoa*) — это прикрепленные колониальные бентосные беспозвоночные (преимущественно морские, реже пресноводные), питающиеся органическими частицами, которые они вылавливают из водной взвеси при помощи венчика щупалец — лофофора. Эти животные появились на Земле в начале ордовика (около 487 млн лет назад), они были разнообразно представлены в водных бассейнах прошлого и живут сегодня. Насчитывается более 6 тыс. видов современных мшанок и более 15 тыс. ископаемых видов [1]. Среди мшанок выделяют три класса: филактолемата (*Phylactolaemata*), стенолемата (*Stenolaemata*) и гимнолемата (*Gymnolaemata*). Филактолематы — это пресноводные мшанки. У представителей этого класса, включающего около 100 современных видов, скелет образован мягкой кутикулой, поэтому их колонии не сохраняются в ископаемом состоянии. Однако статобласты (спящие почки) филактолемат, покрытые хитиновой оболочкой, известны с пермского периода [2]. Стенолематы — это морские мшанки, обладающие кальцитовым скелетом. Они доминировали в палеозое (с раннего ордовика до перми) и продолжают существовать в современных морях [3, 4]. В палеозое гимнолематы были представлены сверлящими мшанками отряда ктеноостомата (*Ctenostomata*). Отряд сохранился и ныне. Ктеноостоматы — это морские, реже пресноводные мшанки, не имеющие минерального скелета. В поздней юре (мезозой) появилась другая группа

гимнолемат — отряд хейлостомата (*Cheilostomata*), которая начиная с позднего мела и поныне является доминирующей и морфологически самой разнообразной группой морских мшанок. Представители хейлостомат могут иметь кальцитовый, арагонитовый или биминеральный скелет [5].




Схема организации зоидов мшанок — с втянутым лофофором (в верхней части) и с вытянутым и развернутым лофофором [7, с изменениями].



Анна Викторовна Коромыслова, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института имени А.А.Борисяка РАН. Область научных интересов — морфология, систематика, палеогеография мшанок ордовика и мела.
e-mail: koromyslova.anna@mail.ru



Зоя Алексеевна Толоконникова, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры региональной и морской геологии Кубанского государственного университета. Специалист в области изучения мшанок позднего палеозоя (морфология, систематика, стратиграфическое значение).
e-mail: zalatoi@yandex.ru



Петр Владимирович Федоров, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры осадочной геологии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. Научные интересы связаны с вопросами стратиграфии, палеонтологии, седиментологии.
e-mail: p.fedorov@spbu.ru



Алексей Валентинович Пахневич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института имени А.А.Борисяка РАН и Объединенного института ядерных исследований. Область научных интересов — девонские, каменноугольные и современные брахиоподы, рентгеновская томография, кристаллографическая текстура биогенного минерального вещества.
e-mail: alvpb@mail.ru

Колонии бывают размером от первых миллиметров до нескольких сантиметров. Но некоторые достигают значительных размеров, как, например, арктическая *Tabulipora* с толщиной ветвей до 7 см [1]. Продолжительность жизни мшанок одних современных видов менее 6 мес, тогда как другие могут жить 50 лет [1, 6].

Колонии состоят из многочисленных крошечных особей размером менее 1 мм (их называют зо-

зоидами [6], тогда как мшанка *Monobryozoon* состоит всего из одного зоида [1, 3].

Как изучают ископаемые мшанки?

Исследование скелетов мшанок разных геологических эпох имеет свои отличительные особенности. Колонии постпалеозойских (мезозойских и кайнозойских) мшанок в основном изучают при помощи

идами), которые выполняют различные функции. Основу колоний составляют автозоиды — самостоятельно питающиеся и размножающиеся особи. В колонии также присутствуют один или несколько типов гетерозоидов, отличающиеся от автозоидов как строением, так и выполняемой функцией. На протяжении фанерозоя в колониях мшанок были развиты гетерозоиды многих различных типов, из которых в данной статье будут упомянуты только неозоиды, эксилязоиды и авикулярии. Неозоиды и эксилязоиды известны только у палеозойских стенолемат. Предполагают, что они служили для обеспечения прочности колонии, а также для увеличения расстояния между лофофарами автозоидов (возможно, это позволяло оптимизировать питание всей колонии). Авикулярии появились в колониях хейлостомат в начале мелового периода, и они многообразны у современных представителей этого отряда. Авикулярии, аналогично различным шипам (в том числе акантостилям палеозойских стенолемат), защищают колонии мшанок как от питающихся ими животных (например, кольчатых червей и рыб), так и тех, которые просто засоряют колонии (например, личинок донных животных, оседающих на мшанках).

В колониях в среднем насчитывается несколько десятков или сотен тысяч зоидов, но возможны и исключения. Например, колония *Flustra foliacea* весом всего 13 г образована около 1 333 000

сканирующего электронного микроскопа, поскольку систематика многих групп этих мшанок базируется преимущественно на внешних морфологических признаках. В основу традиционной систематики палеозойских мшанок положены представления о внутриколониальных структурах. Их описания составляют по ориентированным тонким срезам (шлифам), которые изучают с помощью светового микроскопа. Недостаток подобного метода — разрушение ископаемой колонии. Кроме того, перекристаллизация вещества скелета зачастую может приводить к утрате систематически важных структур и признаков. Достижения технического прогресса неизбежно приводят к появлению новых методов в исследовании окаменелостей. Один из таких новых методов — это рентгеновская компьютерная микротомография. Мы полагаем, что в будущем этот метод исследования будет приобретать все большее значение для исследования палеонтологических объектов. Метод позволяет выявлять разницу в минеральном составе и плотности окаменелости и вмещающей породы.

Ж.Роджер и Э.Бьюдж [8] первыми использовали рентгеновские снимки для изучения кайнозойских мшанок *Cellepora*, обраставших раковины брюхоногих моллюсков. Получены уже первые результаты использования микротомографии для изучения ордовикских [9, 10, 11], каменоугольных [12, 13], пермских [10], юрских [14], меловых [15–19] и современных [20 и др.] мшанок. Как оказалось, применение этого метода значительно расширило возможности ученых. Микротомография позволяет получить тысячи виртуальных срезов колонии в различных плоскостях, которые могут заменять шлифы. На основе виртуальных срезов создаются и трехмерные изображения самих колоний, которые по своей информативности пре-восходят изображения, полученные с помощью сканирующего микроскопа. К тому же при микротомографии колонии не разрушаются, что особенно важно при изучении музеиного материала.

В эволюционном развитии мшанок было несколько переломных рубежей, не всегда совпадающих с коренными перестройками в биоте Земли: ранний и начало среднего ордовика — этап ранней эволюции мшанок; поздний девон — пермь — расцвет палеозойских мшанок, достижение их максимального разнообразия; поздний мел — формирование морфологического разнообразия мезокайнозойских мшанок. Для исследования мшанок мы применяем комплексный подход, сочетающий сканирующую микроскопию и микротомографию с изучением прозрачных ориентированных шлифов в оптическом микроскопе. В статье мы проде-


монстрируем результаты, полученные методом микротомографии при изучении ископаемых мшанок, в частности представителей палеозойских стенолемат и позднемеловых хейлостомат.

Колонии мшанок, изображенные в настоящей статье, сканировали с помощью рентгеновского компьютерного микротомографа Skyscan 1172 (Bruker Corporation) в Центре рентгеноструктурных дифракционных исследований Ресурсного парка Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) и в Палеонтологическом институте имени А.А.Борисяка РАН (Москва).

Древнейшие мшанки

Предполагается, что мшанки могли существовать уже в кембрии, но тогда они еще не имели минерального скелета [21]. Самые древние достоверные находки мшанок имеют возраст около 485 млн лет и происходят из tremadокского яруса нижнего ордовика Южного Китая. Они представлены несколькими видами родов *Prophyllodictya*, *Nekhoroshevella*, *Orbiramus* [22]. Мшанки возрастом 477 млн лет были обнаружены нами [9] в глауконитовых песчаниках флосского яруса нижнего ордовика на территории Ленинградской обл., которая тогда располагалась в центре палеоконтинента Балтика. Древнейшие мшанки Балтики, *Revalotrypa inopinata* и *R.yugaensis*, имели очень мелкие колонии (не более 5 мм в высоту) и состояли из автозоидов и неозоидов.

Представители рода *Planopora* возрастом около 470 млн лет — одни из древнейших билатераль-




Изображения древнейшей мшанки *Revalotrypa inopinata*, полученные с помощью метода рентгеновской компьютерной микротомографии; нижний ордовик, Ленинградская обл. [9].

ных мшанок. Они были обнаружены в одном из карбонатно-глиняных иловых холмов («геккеровых горбов»), формировавшихся одновременно с накоплением вмещающих слоистых глауконитовых известняков дапинского яруса среднего ордовика на территории Ленинградской обл. [10, 11]. В их плоских колониях отверстия зооидов (их называют апертурами) открывались на обе стороны колонии. Апертуры автозооидов *Planopora* имеют лунарии (серповидные структуры, влияющие на ориентацию щупалец лофофора). Разделены автозооиды пузырчатой тканью, которая служила для укрепления колонии и увеличения расстояния между автозооидами. В отличие от мшанок *Revalotrypa gibbosa*, полусферические колонии которых часто крепились к раковинам брахиопод, мшанки *Planopora volkhovensis*, а также булавовидные *Esthoniopora clara* имеют в своем основании холдфаст — прикрепительную структуру, охватывающую цилиндрический объект или несколько разноориентированных объектов, что, вероятно, свидетельствует о возможном их креплении к спикулам губок. В отложениях «геккерова горба» найдены также уникальные колонии *Hemiphragma insolitum*, обраставшие фосфатные трубы широко распространенного палеозойского морского животного сfenоталлус (*Sphenothallus*), который, возможно, принадлежал к кидариям [23].

Перечисленные выше находки ордовикских мшанок пока крайне редки, некоторые из них представлены единичными экземплярами. Метод микротомографии позволил получить многочисленные виртуальные срезы колоний в разных плоскостях, без их разрушения, а также построить 3D-модели самих колоний.

Мшанки позднего палеозоя

Изменение внешнего облика колоний за счет появления новых внутренних структур в позднем палеозое могло быть результатом комплексного воздей-



Изображения дапинских мшанок из «геккерова горба», полученные методом микротомографии; средний ордовик, Ленинградская обл. [10, 11]: 1–3 — *Revalotrypa gibbosa*, обраставшая раковину брахиоподы; 4–6 — *Planopora volkhovensis* и 7 — *Esthoniopora clara*, крепившиеся к спикулам губок; 8–10 — *Hemiphragma insolitum*, обраставшая трубку сfenоталлуса.

ствия биотических и абиотических факторов. Максимума разнообразия мшанки достигли к началу каменноугольного периода (358.9 млн лет назад). Наивысший расцвет характерен для мшанок отряда фенестрат (Fenestellata), особенно для родов *Rectifenestella*, *Spinofenestella* и *Fenestella*, которые образовывали различные сетчатые колонии: вееровидные, пластинчатые, ветвистые, перистые, воронко-видные и др. Форма камер автозооидов первостепенна для определения систематического положения мшанок этого отряда. Внешне похожие сетчатые колонии, относящиеся к неродственным таксонам, обладают разными внутренними структурами, что демонстрирует важность использования метода микротомографии для изучения этих мшанок.


Мы изучили мшанки космополитного рода *Rectifenestella* из Южнокаратауского палеобассейна [13].

На снимках видны сетчатые колонии, образованные бифуркирующими прямыми прутьями с двумя рядами автозоидов пятиугольного сечения и узкими косыми перекладинами без зоидов. Из того же палеобассейна была изучена *Narynella cf. narynica* с одним рядом округлых или трапециевидных в среднем сечении автозоидов на прутьях сетки. Благодаря соединению слабоволнистых прутьев узкими перекладинами через неравномерные промежутки образовывалась крупнопетлистая колония.

Фенестраты господствовали в бентосных сообществах шельфа и материкового склона до конца пермского периода, зачастую успешно конкурируя не только с мшанками, относящимися к иным отрядам, но и с другими группами организмов (брахиоподами, моллюсками, иглокожими). К середине перми (270.6 млн лет назад) колонии фенестрат стали более массивными за счет увеличения количества рядов автозоидов на прутьях. У некоторых родов развивались суперструктуры, образование которых связано с разрастанием киелей на прутьях, разделяющих ряды автозоидов. Кили, срастаясь вместе, формировали защитную сетку над сетчатой колонией. На большей части Восточно-Европейского палеобассейна в казанском веке обитала

мшанка *Wjatkella wjatkensis* [24, 25]. Для нее были типичны воронкообразные колонии с прутьями, несущими 2–4 ряда четырех-шестиугольных в среднем сечении автозоидов, и с широкими короткими перекладинами между ними. Исследование образцов колоний этих мшанок из казанских отложений бассейна р. Сок (Самарская обл.) с помощью микротомографии показало обилие крупных бугорков на высоких килях [10]. Кили и бугорки, кроме выполнения защитной функции, вероятно, были важны для регуляции гидродинамической ситуации вокруг автозоидов и усиления эффективности питания колонии [26].

В казанском веке среднепермской эпохи в Восточно-Европейском палеобассейне кроме фенестрат существовали и представители отряда трепостомата (*Trepostomata*), постепенно теряющие свою доминантную позицию в мшанковых сообществах с конца девонского периода. На восточной окраине палеобассейна численно преобладали трепостоматы из рода *Dyscritella* [24, 25]. Примечательно, что за 218 млн лет существования дискрителл (с девона до конца триаса) произошла смена более чем 120 видов этого рода, причем наибольшее разнообразие видов пришлось на пермский период (71% видового богатства). Для этих мшанок характерны ветвистые, массивные и инкрустирующие колонии. Форма колоний зависела частично от субстрата, на котором изначально закреплялась анцеструла (первый зоид, дающий начало всей колонии). Так, мшанка *Dyscritella incrassata*, обнаруженная в казанских отложениях бассейна р. Сок, возможно, еще при жизни обрастила сетку *Wjatkella wjatkensis*. Благодаря применению микротомографии удалось проследить последовательное разрастание автозоидами *D.incrassata* петель колонии *W.wjatkensis*. Кроме того, на изображениях колоний *D.incrassata*, полученных с помощью микротомографии, различимы два типа акантостилей (они имеют разные размеры), выступающих над поверхностью колонии. Их обилие и хаотичное расположение можно рассматривать либо как способ пассивной защиты от хищников, либо как приспособление для снижения давления воды на ко-



Изображения мшанок из нижнего карбона Южного Казахстана (1, 2) и средней перми Самарской обл. России (3–9), полученные методом микротомографии [10, 13]: 1 — сетчатая колония *Rectifenestella cf. longacella*; 2 — сетчатая колония *Narynella cf. lagulica*; 3–5 — срезы воронкообразной колонии *Wjatkella wjatkensis* с инкрустирующей колонией *Dyscritella incrassata* (выделено красным овалом); 6, 7 — сферическая колония *D.incrassata*; 8, 9 — ветвистая колония *D.spinigeriformis*.


лонию [27]. У *Dyscritella spinigeriformis* из той же сокской мшанковой ассоциации форма колонии ветвистая, но при этом акантостили также дифференцированы. На микротомограмме видов *Dyscritella* обнаружены обильные эксилязоиды в межзооидальных промежутках.

Несмотря на разнообразие адаптивных возможностей у палеозойских мшанок, к концу пермского периода большинство стенолемат навсегда исчезли из морских бассейнов планеты. Конец палеозойской эры стал переломным — произошла смена доминантов в мшанковых ассоциациях на уровне групп и зарождение мезозойской фауны.


Мшанки позднего мела

Ближе к середине позднего мела (86.3 млн лет назад) в морях стали доминировать мшанки отряда *Cheilostomata*, многие из которых имели сложноустроенные колонии. С помощью сканирующей микроскопии и микротомографии мы изучали хейлостомат из отложений кампанского и маастрихтского ярусов Евразии — строение их мелких колоний (менее 15 мм в высоту) в целом, а также морфологию отдельных их зооидов [15–18].

У некоторых хейлостомат, например *Beisselina*, *Pachydermopora* и *Beisselinopsis*, фронтальная поверхность автозооидов сильно обызвествлена, по-



Изображения позднемеловых мшанок, полученные методами сканирующей электронной микроскопии (1, 2, 5, 6, 9, 10) и микротомографии (3, 4, 7, 8, 11, 12) [15–17]: 1–4 — *Pachydermopora grodnoensis* из кампана Белоруссии: 1 — общий вид колонии, 2 — два зооида, 3 — продольный срез зооидов, 4 — 3D-модель зоида; 5–8 — *Beisselinopsis quincuplex* из маастрихта Луганской обл. Украины: 5 — общий вид колонии, 6 — зооид, 7 — продольный срез зооидов, 8 — 3D-модель зоида; 9–12 — *Acoscinopleura occulta* из маастрихта Германии: 9 — общий вид колонии, 10 — зооид, 11 — продольный срез зооидов, 12 — 3D-модель зоида.



Колонии мшанок *Tobolocella levinae* из маастрихта Северного Казахстана [18]: 1 — общий вид колонии, 2 — зоид, изображения получены с помощью сканирующей микроскопии; 3 — продольный срез зоидов, 4 — 3D-модель зоидов, изображения получены с помощью микротомографии.

этому строение колонии скрыто. С помощью микротомографии была изучена форма камер автозоидов, а также пространственное расположение перистома (трубка для выхода лоофоры), выводковых камер и других структур, имеющих систематическое значение для этих мшанок [15, 17].

Особенность хейлостомных мшанок рода *Acoscinopleura* — присутствие одной или нескольких каверн в криптоцисте (известковой пластине, которая подстилала фронтальную мембрану зоидов). Подобные каверны не встречаются у современных мшанок, поэтому их функция неясна. Обычно каверны в колониях *Acoscinopleura* видны на поверхности криптоцисты, так как ее тонкий слой, закрывавший каверну, часто не сохраняется в ископаемом состоянии. Однако у мшанок *A.occulta* каверны в криптоцисте были обнаружены только при микротомографии [16]. Это связано с тем, что часть криптоцисты, закрывающая каверны снаружи, оказалась толще, чем у многих представителей этого рода, и не разрушилась в процессе фоссилизации.

Исследование мшанок *Tobolocella levinae* с помощью метода микротомографии позволило установить в их колониях, помимо автозоидов и авикуляриев, новый тип зоидов (он был назван Т-зоидом) [18]. Т-зоиды и авикулярии образуют ряды, которые чередуются с рядами автозоидов. Т-зоиды меньше автозоидов и не имеют выводковых камер. Они могли быть разновидностью автозоидов (если мягкое тело, заполнявшее их, было таким же, как и в автозоидах) и также выполнять функцию питания колонии. Но, возможно, их мягкое тело было изменено, и по аналогии с авикуляриями они выполняли функцию защиты колонии. Также они могли увеличивать

расстояние между лоофорами автозоидов и тем самым улучшать питание колонии.

Минеральный состав скелета меловых мшанок

Одно из самых распространенных химических соединений, из которых беспозвоночные строят минеральный скелет, — это карбонат кальция. Обычно он представлен двумя минералами — кальцитом и арагонитом, сходными по химическому составу, но различающимися строением кристаллической решетки. Кальцит чаще, чем арагонит, встречается в составе скелета беспозвоночных. Феномен объясняется меньшей устойчивостью арагонита: этот минерал может легко разрушаться или замещаться другими минералами после смерти организма. Однако есть животные с биминеральным скелетом, где присутствуют сразу оба минерала. Таковы, например, многие двустворчатые моллюски, в том числе хорошо известные мидии. Перламутр мидий образован арагонитом, а внешний минеральный слой — кальцитом.

Как мы уже упоминали, среди мшанок минеральным скелетом обладают все представители стенолемат и хейлостоматы. Предполагается, что биминерализация скелета в этих группах мшанок возникла независимо друг от друга, у стенолемат в раннем ордовике, а у хейлостомат — в поздней юре. Все стенолематы имеют кальцитовый скелет, тогда как у хейлостомат он может быть кальцитовым, арагонитовым или биминеральным. Предполагается, что биминеральные виды хейлостомат появились еще в маастрихтском веке позднего мела [5]. Исключение — колонии ордовикских стено-

лемат, в стенках зооидов которых обнаружен фосфат кальция [28]. Помимо световых микроскопов минеральный скелет мшанок изучают с помощью методов рентгеновской порошковой дифракции, лазерной рамановской спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии (в том числе с полевой эмиссией), микрозондового анализа, дифракции обратно рассеянных электронов [5], реже компьютерной рентгеновской микротомографии [29].


Интересные факты зачастую появляются случайно. Так произошло и с коллекцией мшанок рода *Acoscinopileura* из Зенкенбергского музея (Франкфурт-на-Майне, Германия), которая была изучена с помощью микротомографии [16]. На томографических срезах некоторых колоний *A. crassa* (из отложений маастрихтского яруса Германии) было выявлено много контрастных участков, неравномерно распределенных по скелету колонии. Большая часть колонии на срезах была темно-серой, а по контуру внутренней полости зооидов и вокруг латеральных и дистальных септул (структур, обеспечивающих связь зооидов) наблюдался контрастный светло-серый слой, толщина которого варьирует от 0.02 до 1.14 мм. Несмотря на то что контрастные участки хорошо видны на изображениях [16], эта особенность не была отмечена при описании *A. crassa*.

Возможны две интерпретации появления контрастного слоя. Первый вариант — контурный (при вращении объекта на 180°) или круговой (при вращении объекта на 360°) артефакт, который выглядит как тонкий контрастный слой на краю образца. Такие артефакты иногда образуются в процессе микротомографического исследования образца на границе раздела образец/воздух. Причина их возникновения — нарушение настроек оборудования. Однако мы предполагаем, что в нашем случае контрастный слой в скелете мшанок не артефакт. Вращение образца производилось на 180°, поэтому круговой артефакт вокруг округлых структур, в данном случае септул, образоваться не мог. Контрастный слой толще обычного контурного артефакта и распределен неравномерно. Его толщина варьирует, особенно сильно вокруг септул. Есть участки колонии, где этот слой не просматривается. В целом из 110 экземпляров

хейлостомных мшанок, которые изучались на микротомографе в Палеонтологическом институте РАН, только у двух экземпляров *A. crassa* обнаружилась такая особенность.

Второй вариант интерпретации появления контрастного слоя — биминеральный скелет мшанок *A. crassa* (данний факт ранее не указывался). Увеличение контрастности может быть связано с появлением в стенках зооидов колонии примеси или другого минерала, который контрастен с кальцитом или арагонитом. При использованных параметрах томографии (сила тока — 100 мА, напряжение — 100 кВ) эти минералы между собой неконтрастны. Но либо один из них мог быть замещен другим минералом, содержащим химические элементы с большим атомным номером, либо в кристаллической решетке первоначального минерала могли накапливаться ионы-примеси подобных элементов, увеличивающих контрастность. Хорошо известно, что в карбонатах кальций иногда замещается ионами Mg, Sr, Ba, Pb, Zn, Co, Na, U, Fe, Mn, Cu [30].

Остается открытым вопрос, когда произошло замещение контрастным минералом или накопление примесей — в прижизненном состоянии или уже после смерти животного в ходе диагенетических изменений осадочной породы. Возможен и тот и другой вариант. Важно, что контрастность наблюдается не во всей колонии, а только на некоторых



Скелет мшанки *Acoscinopileura crassa*, маастрихт, Хеммор, Германия [16]: 1 — общий вид колонии, снятый с помощью сканирующего микроскопа; 2–7 — результаты микротомографии: 2 — общий вид колонии, прозрачность 90%, 3–5 — продольные срезы вдоль узкой стороны колонии, 6 — продольный срез вдоль широкой стороны, 7 — поперечный срез колонии.

участках стенок зооидов. Это значит, что скелет исходно состоял из минералов, имеющих разные кристаллические решетки, т.е. результаты описанных наблюдений можно рассматривать как косвенное доказательство биминеральности скелетов *A.crassa*. Для уточнения вещественного состава скелетов этих мшанок нужен, безусловно, дальнейший их химический и минеральный анализ.

Ранее хейлостомные мшанки с биминеральным скелетом, жившие в низких широтах, были описаны только из отложений палеогена. Тем не менее предполагалось, что появление биминеральных скелетов должно было произойти ранее – еще в маастрихте, т.е. еще в мезозое [5]. Наши данные подтверждают это предположение, но описанные выше мшанки обитали в высоких широтах. В более ранних публикациях [31] указывалось, что только внешний слой фронтальной поверхности зооидов хейлостомных мшанок мог со-

стоять из арагонита. Однако у изученных мшанок *A.crassa* контрастный слой в основном оконтуривает полость зооидов, реже присутствует во внешнем слое их фронтальной поверхности. Таким образом, можно предположить, что у *A.crassa* арагонит мог присутствовать во внутренних слоях скелета.

* * *

Мшанки – интересная и перспективная группа беспозвоночных, позволяющая проводить эволюционные, морфологические и другие исследования в силу своего высокого разнообразия, адаптивности и длительного существования. Использование комплекса разнообразных методов, в том числе сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской компьютерной микротомографии в сочетании с классической оптической микроскопией, повышает ценность результатов их исследования для биологов и палеонтологов. ■

Работа поддержана Российской фондом фундаментальных исследований (проект 18-05-00245-А). Часть исследований выполнена в рамках государственной программы повышения конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Литература / References

1. Gordon D.P., Taylor P.D., Bigey F.P. Phylum Bryozoa. New Zealand inventory of biodiversity. 1. Animalia. Radiata, Lophotrochozoa, Deuterostomia. D.P.Gordon (ed.). Canterbury, 2009: 271–297.
2. Виноградов А.В. Новые ископаемые мшанки континентальных водоемов азиатской части России и Казахстана. Палеонтологический журнал. 1995; 4: 43–53. [Vinogradov A.V. New fossil freshwater Bryozoans from the Asiatic part of Russia and Kazakhstan. Paleontological Journal. 1996; 30(3): 284–292.]
3. Вискова Л.А. Морские постпалеозойские мшанки. М., 1992. (Труды Палеонтологического института РАН. Т.250). [Viskova L.A. Marine post-Paleozoic Bryozoa. Moscow, 1992. (Transactions of the Paleontological Institute of RAS. V.250). (In Russ.).]
4. Горюнова Р.В. Филогения палеозойских мшанок. М., 1996. (Труды Палеонтологического института РАН. 267). [Goryunova R.V. Phylogeny of Paleozoic bryozoans. Moscow, 1996. (Transactions of the Paleontological Institute of RAS. V.267). (In Russ.).]
5. Taylor P.D., James N.P., Bone Y. et al. Evolving mineralogy of cheilostome bryozoans. Palaios. 2009; 24: 440–452.
6. Клюге Г.А. Мшанки северных морей СССР. М.; Л., 1962. [Kluge G.A. Bryozoans of the northern seas of the USSR. Moscow; Leningrad, 1962. (In Russ.).]
7. Астрова Г.Г., Шишова Н.А. Наставление по сбору и изучению ископаемых мшанок. М., 1963. [Astrova G.G., Shishova N.A. Manual for the collection and study of fossil bryozoans. Moscow, 1963. (In Russ.).]
8. Roger J., Buge É. L'association cellepore-gastropode dans les faluns de la Touraine. Bulletin de la Société Géologique de France Série. 1947; 5(17): 461–470.
9. Fedorov P.V., Koromylova A.V., Martha S.O. The oldest bryozoans of Baltoscandia from the lowermost Floian (lower Ordovician) of north-western Russia: two new rare, small and simple species of Revalotrypidae. Paläontologische Zeitschrift. 2017; 91: 353–373.
10. Коромыслова А.В., Федоров П.В., Толоконникова З.А. Результаты исследования ордовикских и пермских мшанок методом рентгеновской компьютерной микротомографии. Труды Палеонтологического общества. Т.3. М., 2020; 23–31. [Koromylova A.V., Fedorov P.V., Tolokonnikova Z.A. Results of the study of Ordovician and Permian bryozoans by using X-ray micro-CT. Proceedings of the Paleontological Society. V.3. Moscow, 2020; 23–31. (In Russ.).]
11. Koromylova A.V., Fedorov P.V. The oldest bifoliate cystoporate and two other bryozoan taxa from the Dapingian (Middle Ordovician) of north-western Russia. Journal of Paleontology. 2021; 95(1): 24–39. DOI:10.1017/jpa.2020.73.
12. Wyse Jackson P.N., McKinney F.K. A micro-computed tomography and scanning electron microscopy investigation of the structure of *Polyfenestella* Bancroft, 1986 (Bryozoa: Fenestrata), from the Mississippian of Scotland: revealing the nature of its heteromorphs. Irish Journal of Earth Sciences. 2013; 31: 19–24.
13. Tolokonnikova Z., Fedorov P., Wyse Jackson P.N. Bryozoan fauna from the Mississippian of the Akuyuk section, southern Kazakhstan. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen. 2020; 295(2): 159–168.

14. Вискова Л.А., Пахневич А.В. Новая сверлящая мшанка из средней юры Московской области и ее микротомографическое исследование. Палеонтологический журнал. 2010; 2: 38–46. [Viskova L.A., Pakhnevich A.V. A new boring bryozoan from the Middle Jurassic of the Moscow Region and its micro-CT research. Paleontological Journal. 2010; 44(2): 157–167.]
15. Коромыслова А.В., Пахневич А.В. Новые виды *Pachydermopora* Gordon, 2002 и *Beisselina* Canu, 1913 (Bryozoa: Cheilostomida) из кампанского отторженца Белоруссии и их микротомографическое исследование. Палеонтологический журнал. 2016; 1: 40–50. [Koromyslova A.V., Pakhnevich A.V. New species of *Pachydermopora* Gordon, 2002 and *Beisselina* Canu, 1913 (Bryozoa: Cheilostomida) from a Campanian erratic block (Belarus) and their micro-CT investigation. Paleontological Journal. 2016; 50(1): 41–53.]
16. Koromyslova A.V., Martha S.O., Pakhnevich A.V. The internal morphology of *Acoscinopleura* Voigt, 1956 (Cheilostomata, Bryozoa) from the Campanian and Maastrichtian of Central and Eastern Europe. Paläontologische Zeitschrift. 2018; 92: 241–266.
17. Koromyslova A.V., Martha S.O., Pakhnevich A.V. Revision of the *Porina*-like cheilostome Bryozoa from the Campanian and Maastrichtian of Central Asia. Annales de Paléontologie. 2019; 105: 1–19.
18. Koromyslova A.V., Pakhnevich A.V., Fedorov P.V. *Tobolocella levinae* n. gen., n. sp., a cheilostome bryozoan from the late Maastrichtian of northern Kazakhstan: scanning electron microscope and micro-CT study. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen. 2019; 294(1): 91–101.
19. Martha S.O., Ruthensteiner B., Taylor P.D., Hillmer G., Matsuyama K. Description of a new cyclostome species from the middle Santonian of Germany using micro-computed tomography. Australasian Palaeontological Memoirs. 2019; 91–99.
20. Matsuyama K., Titschack J., Baum D., Freiwald A. Two new species of erect Bryozoa (Gymnolaemata: Cheilostomata) and the application of non-destructive imaging methods for quantitative taxonomy. Zootaxa. 2015; 4020: 81–100.
21. Taylor P.D., Waeschenbach A. Phylogeny and diversification of Bryozoans. Palaeontology. 2015; 58(4): 585–599.
22. Ma J.-Y., Taylor P.D., Xia F., Zhan R. The oldest known bryozoan: *Prophyllodictya* (Cryptostomata) from the lower Tremadocian (Lower Ordovician) of Liujiachang, south-western Hubei, central China. Palaeontology. 2015; 58: 925–934.
23. Vinn O., Kirsimäe K. Alleged cnidarian *Sphenothallus* in the Late Ordovician of Baltica, its mineral composition and microstructure. Acta Palaeontologica Polonica. 2015; 60: 1001–1008.
24. Морозова И.П. Мшанки поздней перми. М., 1970. (Труды Палеонтологического института АН СССР. Т.122). [Morozova I.P. Late Permian bryozoans. Moscow, 1970; (Transactions of the Paleontological Institute of the USSR Academy of Sciences. V.122. (In Russ.).)]
25. Tolokonnikova Z. Permian bryozoans from the Nemda horizon (Roadian) of Samara Region, Russia. Paläontologische Zeitschrift. 2020; 94(1): 79–92.
26. Suárez Andrés J.L., Wyse Jackson P.N. Feeding currents: a limiting factor for disparity of Palaeozoic fenestrate bryozoans. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2015; 433: 219–232.
27. Ernst A. Bryozoa of the Upper Permian Zechstein Formation of Germany. Senckenbergiana lethaea. 2001; 81(1): 135–181.
28. Conti S., Serpagli E. Bimineralic (calcareous and phosphatic) skeleton in Late Ordovician Bryozoa from Sardinia: geological implication. Bollettino della Società Paleontologica Italiana. 1988; 27(2): 129–162.
29. Jacob D.E., Ruthensteiner B., Trimby P. et al. Architecture of *Anoteropora latirostris* (Bryozoa, Cheilostomata) and implications for their biomimetic mineralization. Scientific Reports. 2019; 9(11439).
30. Мак-Коли Дж. Кальцита группа. Минералогическая энциклопедия. Л., 1985; 95–99. [McCauley J.W. Calcite group. The encyclopedia of mineralogy. Leningrad, 1985; 95–99. (In Russ.).]
31. Benedix G., Jacob D.E., Taylor P.D. Bimineralic bryozoan skeletons: a comparison of three modern genera. Facies. 2014; 60: 389–403.

Microtomography of Fossil Bryozoans

A.V.Koromyslova¹, Z.A.Tolokonnikova^{2,3}, P.V.Fedorov⁴, A.V.Pakhnevich^{1,5}

¹Borissiak Paleontological Institute, RAS (Moscow, Russia)

²Kuban State University (Krasnodar, Russia)

³Kazan Federal University (Kazan, Russia)

⁴Department of Sedimentary Geology, Institute of Earth Sciences (St.Petersburg, Russia)

⁵Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, Moscow Oblast, Russia)

Bryozoans are colonial animals with a complex skeleton. The methods that are usually used to study the internal structure of fossil colonies of bryozoans are often destructive, laborious, and provide little information. This essay presents the results of the study of Paleozoic and Mesozoic bryozoans using X-ray computed microtomography. We believe that in future this method will become increasingly important for the study of fossils.

Keywords: paleontology, Bryozoa, X-ray micro-CT, Ordovician, Carboniferous, Permian, Late Cretaceous.